



CODI SÈPSIA: ABORDATGE INFERMER DEL MALALT SÈPTIC A URGÈNCIES

Raúl Martínez Izquierdo, Laura Grimal Abejez, Maria Isabel Serrano Camacho, Julian Arias Grande, Marta Samaranch Gusi,
Neus Robert Boter

Servei Urgències, Hospital Germans Trias i Pujol

INTRODUCCIÓ

La sèpsia és una patologia temps depenent, prenent especial importància la rapidesa del diagnòstic i de l'inici del tractament. L'activació del codi sèpsia permet la detecció d'aquests pacients i l'inici precoç del seu abordatge.

OBJECTIU

Descriure les característiques dels pacients codificats com a codi sèpsia, la complexitat i càrrega assistencial de les cures d'infermeria necessàries durant la seva estada al servei d'urgències

METODOLOGIA

Estudi descriptiu retrospectiu observacional de no intervenció dels pacients amb activació de Codi Sèpsia a Urgències d'abril fins desembre del 2024.

RESULTAT

S'han realitzat 210 activacions. S'han exclòs 3 episodis per no ser sèpsia i 7 per correspondre a edats pediàtriques. La mitjana d'edat ha sigut de 67anys amb una DE $\pm 15,8$. El 39% dels casos corresponen a dones. El 15,5% pacients presentaven alteració del nivell de consciència a l'arribada.

Respecte les cures d'infermeria es van realitzar hemocultius en el 93,5% dels cassos, canalitzar catèters venosos perifèrics (CVP) en 199 pacients, el 66,6% van precisar ?2 CVP i el 36% van ser portadors d'un accés vascular central; el 50% canalitzats per infermeria.

Van precisar suport respiratori en forma de Ventilació Mecànica No Invasiva o Cànules Nasals d'Alt Flux el 10% dels pacients i drogues vasoactives el 23,5%.

Van ser portadors d'una sonda vesical el 78% dels pacients. El 7% eren portadors a l'arribada i al 93% se'ls va realitzar el sondatge a urgències.

Nomes el 47% dels pacients van ser atesos a un box de semicrítics d'urgències.

CONCLUSIONS

El malalt sèptic comporta una càrrega assistencial alta i cures d'infermeria complexes, amb necessitat de realització de múltiples tècniques, administracions i control continu de l'estat del pacient. Destaca que més de la meitat d'aquests pacients son atesos a boxs convencionals, on la ratio d'infermeria per pacient és més alta (6:1) que a un box de semicrítics (4:1)